

Scalibor® collar (deltametrina)

033037.01.000F.230

USO VETERINARIO.

Composición: Collar de 48 cm: Deltametrina 0,760 mg, excipiente c.s.p. 19 g.

Collar de 65 cm: Deltametrina 1 g, excipiente c.s.p. 25 g.


Indicaciones: Prevención de las infestaciones por garrapatas durante 6 meses. Prevención de las infestaciones por pulgas durante 4 meses. Scalibor tiene un efecto repelente (antialimentación) para los *Phlebotomus spp.*, por lo que puede usarse como parte de un programa de prevención de la leishmaniosis. **Modo de aplicación:** Ajustar el collar, sin apretar, alrededor el cuello del animal. Cortar el exceso de collar, dejando 5 cm tras el pasador. El collar empieza a ser efectivo una semana después de su colocación. El collar puede empezar a ser utilizado en cachorros a partir de las 7 semanas de vida.

Precauciones especiales de uso: No utilizar el collar en animales con lesiones cutáneas extensas. **Contraindicaciones:** no se han descrito. **Efectos secundarios:** en algunas ocasiones se han observado reacciones alérgicas locales (prurito, enrojecimiento de la piel, pérdida de pelo) de carácter leve. Más raramente, pueden presentarse reacciones de hipersensibilidad general. Los síntomas son reversibles una vez retirado el collar. **Uso durante la gestación y lactancia:** No se han observado efectos secundarios en perras gestantes que llevaron el collar durante la gestación y el período de lactación, ni en cachorros de madres tratadas hasta el destete. **Interacción e incompatibilidades:** No se han descrito. **Sobredosis:** En caso de ingestión accidental del collar, podrían observarse los siguientes síntomas: pérdida de coordinación de los movimientos, temblor, hipersalivación. Estos síntomas son reversibles dentro de las primeras 48 horas. En caso de intoxicación aguda, tratar las convulsiones con diazepam. **Precauciones especiales para la persona que aplique el producto:** Mantener lejos de bebidas, alimentos y piensos. Mantener el envoltorio bien cerrado hasta el momento del empleo. Lavarse las manos con jabón y agua fría tras manipular el collar. Mantener fuera del alcance de los niños. No permitir que los niños jueguen con el collar o lo chupen. **No precisa condiciones especiales de almacenamiento.** La deltametrina es tóxica para los peces y las abejas. Después de usar el collar no debe tirarse en el medio ambiente ni en el agua. Todo medicamento veterinario no utilizado o los residuos derivados del mismo deberán eliminarse de conformidad con las normativas locales. **Presentación:** Estuches conteniendo 1 collar.

Reg. n°: 1326 ESP

Laboratorios Intervet, S.A.

Polígono El Montalvo

The logo for Intervet, featuring the word "intervet" in a lowercase, italicized serif font, enclosed within a stylized, curved graphic element that resembles a swoosh or a partial circle.